

## Efectos de la Drogadicción, el Alcoholismo y el Tabaquismo sobre el Embarazo

MARGARITA E. CHIANI

*Cátedra de Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas,  
Universidad Nacional de La Plata,  
calles 60 y 120, La Plata 1900, Argentina*

**RESUMEN.** Se consideran los posibles efectos nocivos que la adicción a las drogas de uso más frecuente —analgésicos narcóticos, marihuana, alcohol y tabaco— pueden causar sobre el producto de la concepción.

**SUMMARY.** "Effects of drug adiction, alcoholism and tobaccoism on the product of conception". Possible noxious effects of more frequently used drugs --analgesics, marihuana, alcohol and tobacco-- on phoetus are considered.

Durante el embarazo, el niño puede quedar expuesto a la acción de una gran variedad de drogas, ya sea por la administración terapéutica de las mismas o por abuso de los progenitores<sup>1</sup>.

Se hará referencia a la segunda de las mencionadas instancias, es decir a los posibles efectos nocivos que la adicción a las drogas de uso más frecuente puede causar sobre el producto de la concepción. Conjuntamente se considerarán las consecuencias del alcoholismo y del tabaquismo y su interacción sobre el feto.

### ANALGESICOS NARCOTICOS (OPIACEOS O HIPNOANALGESICOS)

En las madres adictas gestantes es posible observar una doble patología ligada al uso de analgésicos narcóticos tales como heroína, morfina, metadona, pentazocina, dextropropoxifeno, etc. Esta doble patología se refiere por un lado a los

efectos tóxicos sobre el embrión y/o el feto<sup>2</sup> y por otro el surgimiento al una dependencia física de éste hacia el analgésico o narcótico, lo que se traducirá en la aparición de un verdadero síndrome de abstinencia en el recién nacido, a las pocas horas del parto<sup>3</sup>.

A propósito de las madres toxicómanas Thieffry<sup>4</sup> declaró que "el uso mundial de drogas hace aparecer y multiplicar una singular patología: la del recién nacido toxicómano". Esto acontece porque, durante la gestación, el feto absorbe su dosis cotidiana de droga a través del cordón umbilical que lo liga a la madre toxicómana. El nacimiento suprime brutalmente la dosis periódica y activa al recién nacido, determinando que a las pocas horas después del parto, los neonatos resultantes de tales embarazos presentan efectos análogos a los síntomas de abstinencia del adulto<sup>3</sup>.

**PALABRAS CLAVE:** Embarazo; Drogadicción; Alcoholismo; Tabaquismo

**KEY WORDS:** *Pregnangcy; Drug addiction; Alcoholism; Tobaccoism*